

Suivi et gestion des milieux



P. 4

Les zones humides françaises : évolutions récentes

Première partie : les milieux

C. Fouque, M.-C. Ximenès, G. Barnaud, D. Levet, J. Broyer

Une enquête menée pour la période 1960-1990 avait montré une très forte dégradation des zones humides françaises d'importance majeure (rapport d'évaluation de 1995). Une nouvelle enquête, reprenant la démarche antérieure, a été diligentée sur ces mêmes zones pour la période 1990-2000 dans le cadre de l'Observatoire national des zones humides (IFEN) par le réseau « Oiseaux d'eau & Zones humides » ONCFS/FNC. Premier bilan sur l'évolution de ces milieux et des politiques publiques en la matière.

Suivi et gestion des populations

P. 13

Fécondité des femelles de Mouflon méditerranéen

J.-M. Cugnasse, M. Garel, P. Gibert, J.-M. Jullien, P. Douvre, FDC de la Drôme, D. Dubray

Afin de mieux connaître les capacités de reproduction du Mouflon, deux populations alpines et une population méridionale ont été comparées par l'analyse *post-mortem* d'ovaires de femelles prélevées à la chasse. Il s'avère que les populations alpines se caractérisent par une maturité sexuelle plus précoce et un taux de géminité plus élevé que la population méridionale. Ces différences de fertilité pourraient être dues principalement à l'origine génétique des animaux et à leur environnement. Cette hypothèse est discutée.



La présence du Daim et du Cerf sika dans nos milieux forestiers n'est pas naturelle, mais essentiellement due à des animaux échappés de captivité. Or, ces effectifs sauvages sont en progression depuis une vingtaine d'années sur notre territoire, ce qui pose certains problèmes. Une enquête sur l'évolution des tableaux de chasse réalisée par les interlocuteurs techniques du réseau *Ongulés sauvages* permet de préciser l'état de la situation.

Technique

P. 23

L'indice d'abroustissement : un nouvel indicateur de la relation « forêt-gibier » ?

T. Chevrier, S. Saïd, C. Toïgo, J.-P. Hamard, F. Klein, C. Saint-Andrieux, B. Chopard

Les gestionnaires forestiers s'interrogent sur la capacité des peuplements arborescents à se régénérer sous une pression animale qui



s'accroît. En réponse, un nouvel « indice d'abroustissement » des semis de chênes par le Chevreuil a été testé, afin de diagnostiquer la pression de consommation de ce cervidé sur les essences objectifs. Cet article définit le cadre d'application de cet outil utilisable par tous les gestionnaires de la faune sauvage.

P. 28

Les méthodes de suivi de la Gélinotte des bois

Analyse comparative et proposition alternative

M. Montadert, P. Léonard, P. Longchamp

En France, suivre l'évolution d'une population de Gélinotte des bois est un exercice difficile ; l'espèce est en effet très discrète et vit dans les milieux forestiers denses de 200 à 1 800 m d'altitude. Mais quelles sont les méthodes de suivi utilisées ? Sont-elles fiables et efficaces ? Peut-on envisager d'autres approches ? L'étude présentée dans cet article apporte des réponses à ces trois questions.



Chasse & droit

P. 36

Les modifications récentes au régime des armes et la chasse

A. Charlez

Le point sur les changements intervenus dans la réglementation depuis ces 10 dernières années.

Nouvelles des réseaux

P. 44

Réseau national Oiseaux de passage

Le programme Alaudidés, Colombidés et Turdidés en France : bilan de l'enquête 2005

D. Roux, J.-M. Boutin, H. Lormée, J.-L. Tesson

Réseau Perdrix-Faisans

Synthèse des données 2005

F. Reitz, P. Mayot

Informations scientifiques

P. 46

Y. Ferrand

Il faut aider les faisans !

D'après une étude anglaise, avec quelques efforts de plus et notamment en prolongeant la période de soutien alimentaire, les résultats des lâchers de faisans pourraient être bien meilleurs...



Les aléas climatiques rendent les sarcelles vagabondes

Une analyse de sarcelles baguées et mesurées en Camargue en hiver indique que les oiseaux décident bien de rejoindre un quartier d'hivernage donné au cours de l'hiver ; ce qui laisse présager des changements à venir dans leur distribution hivernale à la faveur du réchauffement climatique.

Tableaux de chasse et indices d'abondance : la leçon danoise

Une étude qui nous rappelle à la prudence dans les interprétations...

Supplément

Détachable en pages centrales

Tableaux de chasse Cerf-Chevreuil-Sanglier Saison 2004-2005

Réseau « Ongulés sauvages » ONCFS/FNC/FDC