



Suivi et gestion des milieux

P. 4

Les zones humides françaises : évolutions récentes

Deuxième partie : les espèces envahissantes

C. Fouque, M.-C. Ximènes, G. Barnaud, D. Levet, R. Berrebi, L. Duhautois, J.-P. Amauduc

Une enquête portant sur l'évolution des zones humides françaises a permis de mettre en évidence la poursuite de la disparition et de la dégradation de ces milieux dans les années 1990, mais à un rythme moindre que dans les années 1960 à 1980 (voir le précédent numéro de *Faune Sauvage*). Outre ces pertes sensibles, l'enquête révèle également que les espèces envahissantes, tant animales que végétales, semblent constituer un second problème majeur qui se serait véritablement développé au cours de la décennie 1990. Le point sur cette autre menace pesant sur ces écosystèmes fragiles.

Suivi et gestion des populations

P. 16

Les biches suitées : un indicateur pour la gestion des populations de Cerf ?

J.-L. Hamann, H. Holveck, F. Klein, C. Bonenfant, J.-M. Gaillard

Chez le Cerf, le taux de femelles suitées est couramment obtenu à partir des observations effectuées sur le terrain tout au long de l'année. La question est de savoir si ces observations reflètent correctement le statut reproducteur des femelles, auquel cas ce taux constituerait un indicateur intéressant de l'état d'équilibre population/habitat. Pour y répondre, une étude a été réalisée à partir de biches marquées sur la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de La Petite-Pierre (Bas-Rhin). Les données récoltées sur plus de 10 ans montrent que la méthode du rapport nombre de faons sur nombre de femelles est largement biaisée...



P. 22

Conservation de la Perdrix grise : la France au premier rang

Bilan des 10 dernières années de suivi des populations

E. Bro, F. Reitz, P. Mayot, P. Landry

Le statut de la Perdrix grise de plaine est jugé défavorable à l'échelle de l'Europe. En France, sa situation apparaît très hétérogène mais on rencontre toujours de belles densités dans le Centre-Nord, faisant de



cette région le bastion européen de l'espèce. Cet article présente un bilan détaillé de l'évolution de sa situation en France depuis ces 10 dernières années grâce aux données du Réseau national « Perdrix-Faisan », fruit d'un long partenariat entre les FDC et l'ONCFS.

Technique

P. 31

Le GPS et l'étude des ongulés sauvages

F. Klein, J.-P. Gendner, D. Storms, J.-L. Hamann, S. Saïd, J. Michallet, E. Pfass

La technique du GPS a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, au point qu'elle est maintenant bien développée pour le suivi animalier. Ainsi, différents colliers sont à présent utilisés en routine sur le Cerf, le Sanglier, le Bouquetin, le Chevreuil ou encore le Mouflon. Cet article explore les avantages comme les limites d'utilisation de cet outil, ainsi que ses possibilités d'applications sur le terrain, puis propose quelques exemples concrets issus des projets de recherche menés actuellement par l'ONCFS.

Chasse & droit

P. 39

La chasse du Sanglier et le droit

A. Charlez

Revue de détail actualisée du statut juridique du Sanglier, ainsi que des mesures relatives à sa chasse et à la gestion de ses populations, sur le territoire français.





Informations scientifiques

P. 46

Par Y. Ferrand

Positive attitude pour l'agri-environnement en Suisse

Une évaluation des mesures agri-environnementales menées en Suisse a confirmé leur impact positif sur la micro-faune et la flore. Des résultats au bénéfice de la faune qui incitent à poursuivre les efforts.

Des sarcelles finlandaises très sélectives

Une étude conduite dans le Sud de la Finlande de 1989 à 2004 met en évidence une certaine fragilité des sarcelles d'hiver dans leurs habitats de reproduction. Concentrée sur quelques sites, la production de canetons est soumise aux aléas « écologiques ».

Renards, campagnols et autres proies

D'après une étude menée par des chercheurs de l'Université de Bristol, la régulation des populations de renards a un intérêt plus large que le maintien du seul gibier...

Nouvelles des réseaux

P. 44

Réseau Bécasse ONCFS/FNC

Suivi en temps réel des effectifs de bécasses en migration et en hivernage

Y. Ferrand, M. Guénézan, F. Gossmann, C. Bastat



faune sauvage

272 juin 2006