Mise en œuvre d'un indicateur de soutien à la biologie à travers de la notion de pression-impact : exemple des nutriments

Anne DANIEL, Dominique SOUDANT, Alice LAMOUREUX,
Charlotte PROVOST

IFREMER DYNECO/PELAGOS - Brest, IFREMER VIGIES - Nantes

Rôle pondérateur des indicateurs physico-chimiques

Éléments et fréquence de suivi minimale définis par la directive

Élément de qualité	Eaux de transition	Eaux côtières
<i>Phytoplancton</i>	<i>6 mois</i>	<i>6 mois</i>
Température	3 mois	3 mois
Salinité	3 mois	/
Transparence	/	/
Bilan d'oxygène	3 mois	3 mois
Nutriments	3 mois	3 mois

Seuils et métriques des éléments de qualité physico-chimiques

Ifremer

DYNECO/PELAGOS
DYNECO/VIGIES

Anne Daniel
Dominique Soudant

Rapport DYNECO/PELAGOS/09.02

Évaluation DCE avril 2009

Élément de qualité : bilan d'oxygène

Avertissement : les résultats présentés ici résultent d'une application d'évaluation de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), mais ne préjuge pas du classement final et officiel DCE de l'état écologique des masses d'eau, la pertinence de l'évaluation est discutée en raison d'un faible nombre de mesures.

Ifremer

DYNECO/PELAGOS
DYNECO/VIGIES

Rapport DYNECO/PELAGOS/09.03

Évaluation DCE avril 2009

Élément de qualité : température

Ifremer

DYNECO/PELAGOS
DYNECO/VIGIES

Anne Daniel
Dominique Soudant

Rapport DYNECO/PELAGOS/10.03

Évaluation DCE mai 2010

Élément de qualité : nutriments

ONEMA

Partenariat 2010
Qualité des masses d'eau littorales
(eau côtières et de transition)
Action 1

Ifremer

Évaluation DCE février 2011

Élément de qualité : transparence

Rapport final

Anne Daniel IFREMER DYNECO/PELAGOS
Dominique Soudant IFREMER DYNECO/VIGIES

Février 2011

Evaluations annuelles sur période n-6

Ecotype-Vilaine

Période de référence: 2011-2016
Extraction des données: Nutrimets: 11/10/2017

Situation

Point(s) contributif(s)

Memo-point	Libellé-point	Code-masse-eau	Statut	Nombre-de-mesures-utilisées
063-P-002	Ouest-Lozolo	FRGC44	DCE	38
065-P-012	Aval-Tréhignier-56V100	FRGT27	DCE	16

065-P-013	Le-Petit-Sacé-56V120	FRGT27	DCE	23
062-P-018	Nord-Dumet	FRGC45	DCE	24

Graphique(s)

FRGC44--Baie-de-Vilaine (cote)

Période de référence: 2011-2016
Extraction des données: Nutrimets: 06/10/2017
Extraction des données: biomasse: 18/10/2017

Description de la masse d'eau

Typologie	CS - Côte: l'estuaire modérément exposée
Ecotype	Vilaine
ME de surveillance	Ouie
ME opérationnelle	Ouie
ME turbide	Non

Évaluation de l'élément de qualité

Nutrimets	EQR (CQ) =	=
	Grille =	=
	Classe =	=
	Confiance =	=

Évaluations des indices de l'élément de qualité

NID	Indice (CQ) =	21.8 (16.28-39)
	Seuil =	20-23
	Confiance =	34.6-50

Information complémentaire: indice-biomasse

Biomasse	N =	47 (43)
	Indice =	11.3
	Grille de l'Indice =	5 - 10 - 20 - 40
	EQR (CQ) =	0.3 (0.26-0.43)
	Grille =	0.05 - 0.17 - 0.33 - 0.67
	Classe =	3
	Confiance =	0.58-84-0-0

N	nombre d'observations disponibles / nombre d'observations attendues
Indice	résultat du calcul de la moyenne dans l'unité de référence
Grille de l'Indice	grille de lecture de l'indice définissant les 5 classes d'état
EQR	Biologique/Qualité Ratio, indice ramené sur l'intervalle (0-1), 0 étant le pire et 1 le meilleur
CQ	intervalle de confiance à 95% de l'EQR
Grille	grille de lecture de l'EQR définissant les 5 classes d'état du pire au meilleur
Classe	état de la masse d'eau au regard de l'EQR
Confiance	probabilité d'appartenance de la masse d'eau à chacune des 5 classes d'état au regard de la masse d'eau de la meilleure à la pire

Commentaire

Cette première évaluation de l'Indice Nutrimets est uniquement basée sur l'Indice NID

- Etat des lieux des données disponibles
- Acquisition d'un jeu de données -> mise en place du contrôle de surveillance
- Elaboration de seuils et de métriques en prenant en compte les facettes écologique, chimique, statistique et réglementaire

1^{ère} étape : acquisition de données

- Quelle forme chimique? N, P, Si
- Quelle phase? particulaire ou dissoute?
- Quels éléments dissous? NH_4 , NO_3 , NO_2 , PO_4 , $\text{Si}(\text{OH})_4$
- Quelle fréquence de prélèvement et à quelle période?

1^{ère} étape : acquisition de données

Multiples paramètres intervenant dans la relation « enrichissement en nutriments » et « eutrophisation de la zone côtière » :

- déphasage temporel,
- turbidité,
- relation salinité-nutriments
- hydrodynamisme de la zone,
- nature du sédiment,
- etc...

1^{ère} étape : acquisition de données

-> Période hivernale : concentrations max. pour la biologie en début de période productive

1^{ère} étape : acquisition de données

Quel élément chimique?

-> élément généralement limitant dans les eaux côtières

2^{ème} étape : élaboration d'une métrique

A partir de :

- flux?

- rapport molaire?

- concentration?

Nécessité de la prise en compte de la salinité pour permettre une comparaison des MEC et MET

2^{ème} étape : élaboration d'une métrique

-> Normalisation de la concentration à salinité 33

Valeur seuil calculée pour l'ensemble des masses d'eau situées sur un même bassin versant

2^{ème} étape : élaboration d'une métrique

Typologie DCE ne répond pas à la notion de bassin versant

-> Introduction de la notion d'écotype qui présente l'avantage de lier les MET et MEC

ECOTYPE

SW Cotentin
Rance
St Briec
Paimpol - Perros-Guirec
Lannion - Morlaix
Nord finistère
Brest - Elorn
Brest - Aulne
Douarnenez-audierne
Sud finistère
Laita
Lorient
Etel
Loire
Golfe morbihan
Vilaine
Vendée
Pertuis Breton
Pertuis charentais

Masses d'eau

FRGC45	Baie de Vilaine (large)
FRGC46	Loire (large)
FRGT28	La Loire
FRGC48	Baie de Bourgneuf
FRGC47	Ile d'Yeu
FRGC49	La Barre-de-Monts

Métrique nutriments =
concentration d'azote inorganique dissous (μM)
normalisée à 33 de salinité d'un écotype

3^{ème} étape : élaboration de seuils

- Longues séries historiques
- Seuils existants
- Relation pression – impact

3^{ème} étape : élaboration de seuils

Relation pression – impact basée sur le modèle de Vollenweider
-> concentration influençant le bon état écologique

Quel EQR biologique :
- biomasse?
- composition phyto?
- macroalgues?

3^{ème} étape : élaboration de seuils

Seuils 2010

basés sur des données historiques du RNO hydro et des réseaux de surveillance régionaux

3^{ème} étape : élaboration de seuils

EC manche atlantique 1/26a, ET manche atlantique

Seuils 2013

basés sur données
DCE 2007 – 2012

-> figure de type
« coin inversé »

-> mise en évidence
de pressions multiples

3^{ème} étape : élaboration de seuils

Valeur modérée

Valeur tolérante

Valeur de précaution

Indicateur intégré biomasse - concentration hivernale normalisée

Comparaison européenne

2007 Workshop Zandword (NL)

2011 Workshop Birmingham (UK)

2012 Questionnaire sur paramètres surveillés (CIS 2012)

continuum terre – mer : lacs, rivières, transition,
côtier

Questionnaire 2012

Eaux de transition												
	DE	LV	RO	ES	PL	BG	IT	FR	UK	NL	SE	
Total Phosphorus or Total Dissolved Phosphorous or Soluble Reactive Phosphorous (mg l ⁻¹)	1				1	1				1	1	
Total Nitrogen (mg l ⁻¹)	1				1	1				1	1	
Dissolved Oxygen Concentration (mg l ⁻¹)			1		1	1	1	1	1		1	
pH or delta pH			1		1	1						
Nitrate (mg l ⁻¹)	1		1	1	1							
Orthophosphate (mg l ⁻¹)	1		1	1	1	1	1				1	
Total Ammonium (mg l ⁻¹)			1	1	1							
Oxygen Saturation Percentage (%)			1	1	1					1		
Secchi Depth (m) or Transparency (m)		1	1	1	1					1	1	
BOD5 (mg l ⁻¹)			1		1	1						
Water temperature (C) or delta temperature										1		
Nitrite (mg l ⁻¹)			1	1								
Total Inorganic Nitrogen or Dissolved Inorganic Nitrogen	1			1	1		1	1	1			
Total Organic Carbon (mg l ⁻¹)				1	1							
Non-ionised Ammonia (mg l ⁻¹)									1			
Salinity (‰)			1									
Organic Nitrogen (mg l ⁻¹)					1					1		
Silicate (mg l ⁻¹)			1									
Morphological and or hydromorphological conditions				1								
N total soluble (mg/kg settled sediment)				1								
P total (mg/kg settled sediment)				1								
DIN, Winter, nov-feb, 0-10m (EQR)											1	
Turbidity (NTU)				1								

d'après rapport 5-
CIS ECOSTAT
(2012)

Questionnaire 2012

Eaux côtières													
	DE	LV	RO	ES	PL	IT	FR	UK	EE	FI	NL	SE	
Total Phosphorus or Total Dissolved Phosphorous or Soluble Reactive Phosphorous (mg l ⁻¹)	1				1				1	1	1	1	
Total Nitrogen (mg l ⁻¹)	1				1				1	1	1	1	
Dissolved Oxygen Concentration (mg l ⁻¹)			1		1	1	1	1				1	
pH or delta pH			1		1								
Nitrate (mg l ⁻¹)	1		1	1	1								
Orthophosphate (mg l ⁻¹)	1		1	1	1	1	1					1	
Total Ammonium (mg l ⁻¹)			1	1									
Oxygen Saturation Percentage (%)	1		1	1	1						1		
Secchi Depth (m) or Transparency (m)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	
BOD5 (mg l ⁻¹)			1		1								
Water temperature (°C) or delta temperature							1				1		
Non ionised Ammonia NH4-N (mg l ⁻¹)								1					
Nitrite (mg l ⁻¹)			1	1									
Total Inorganic Nitrogen or Dissolved Inorganic Nitrogen (mg l ⁻¹)	1			1	1	1	1	1			1		
TotalOrganicCarbon (mg l ⁻¹)				1	1								
Salinity (‰)			1			1							
Organic Nitrogen (mg l ⁻¹)					1								
Silicate (mg l ⁻¹)			1										
Morphological and or hydromorphological conditions				1									
N total soluble (mg/kg settled sediment)				1									
P total (mg/kg settled sediment)				1									
Wave Exposue (CIS. 2.4)	1												
DIN, Winter, nov-feb, 0-10m (EQR)												1	
Turbidity (NTU)				1			1						

d'après rapport 5-
CIS ECOSTAT
(2012)

Comparaison européenne

2007 Workshop Zandword (NL)

2011 Workshop Birmingham (UK)

continuum terre – mer : lacs, rivières, transition,
côtier

2012 Questionnaire sur paramètres surveillés (CIS 2012)

2014 Nomination d'experts par pays et constitution d'un groupe de travail piloté par l'Allemagne sur 3 ans

2015 Réunion 1 : synthèse de questionnaires (paramètres, fréquences, périodes et seuils) Texeira et al. 2016, Phillips & Pitt 2015, Dworak et al. 2016

Comparaison 2014 des seuils nutriment dans les eaux de transition

Country	National Type	TN in mg/l			TP in microg/l			Phosphate			Nitrate			DIN			Comments
		Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	
Belgium	O1o	S			S			Y					Y			Y	
Belgium	O1b							S									
Belgium	O2zout							S									
France	all														W		
France	all														W		
Germany	T1, T2	Y			Y										W		
Ireland	TW2								W/S								
Ireland	TW2								W/S								
Ireland	TW2								W/S								
Netherlands															W		
Portugal	A1								Y				Y				
Portugal	A1								Y				Y				
Portugal	A1								Y				Y				
Portugal	A1								Y				Y				
Spain	AT-T07						Y		Y								
Spain	AT-T08						Y		Y								
Spain	AT-T09						Y		Y								
Spain	AT-T10						Y		Y								
Spain	AT-T11						Y		Y								
Spain	AT-T12						Y		Y								
Spain	AT-T13						Y		Y								
Sweden	Göta Älvs och Norde Älvs estuarie	W/S			W/S		W								W		
UK	TW1														W		additional boundary value for inorganic nitrogen depending on turbidity levels of waters. 99th percentile DIN - 70µM for intermediate waters SPM range
UK	TW2														W		
UK	TW3														W		
UK	TW4														W		
UK	TW5														W		

Comparaison 2014 des seuils nutriments dans les eaux côtières

Country	National Type	TN in mg/l			TP in microg/l			Phosphate			Nitrate			DIN		
		Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile
Belgium	CWSB1	W						W								
France	all													W		
France	all													W		
Germany	N1	Y			Y									W		
Germany	N2	Y			Y									W		
Germany	N3	Y			Y									W		
Germany	N4	Y			Y									W		
Germany	N5	Y			Y									W		
Ireland	CW2, CW5, CW6 and CW8														W	
Ireland	CW2, CW5, CW6 and CW8														W	
Sweden	1n	W/S			W/S			W						W		
Sweden	1s	W/S			W/S			W						W		
Sweden	2	W/S			W/S			W						W		
Sweden	3	W/S			W/S			W						W		
Sweden	4	W/S			W/S			W						W		
Sweden	5	W/S			W/S			W						W		
Sweden	6	W/S			W/S			W						W		
UK	CW1													W		
UK	CW2													W		
UK	CW3													W		
UK	CW4													W		
UK	CW5													W		
UK	CW6													W		
UK	CW7													W		
UK	CW8													W		
UK	CW11													W		
UK	CW12													W		

Comparaison 2014 des seuils nutriments dans les eaux côtières

Country	Transitional									Coastal									Marine									Consistent Monitoring for all 3 types
	TN			Nitrate			DIN			TN			Nitrate			DIN			Nitrate			DIN						
	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	Mean	Median	90% percentile	
Belgium	S					Y			Y	W																		
France							W									W												
Germany	Y						W		Y							W								W				
Ireland																W/S								W				
Netherlands							W									W								W				
Norway	N/A no trans. defined									W/S			W/S						N/A No info reported									
Portugal						Y									Y				N/A No info reported									
Spain				Y								Y							?									
Sweden	W/S						W			W/S						W												
UK							W									W								W				

Comparaison 2014 des seuils nutriments dans les eaux côtières

Comparaison européenne

2007 Workshop Zandword (NL)

2011 Workshop Birmingham (UK)

continuum terre – mer : lacs, rivières, transition,
côtier

2012 Questionnaire sur paramètres surveillés (CIS 2012)

2014 Nomination d'experts par pays et constitution d'un groupe de travail piloté par l'Allemagne sur 3 ans

2015 Réunion 1 : synthèse de questionnaires (paramètres, fréquences, périodes et seuils) Texeira et al. 2016, Phillips & Pitt 2015, Dworak et al. 2016

2016 Réunion 2 : Evaluation de l'outil pression-impact sur le jeu de données fourni lors de l'intercalibration biomasse

Comparaison européenne

2007 Workshop Zandword (NL)

2011 Workshop Birmingham (UK)

continuum terre – mer : lacs, rivières, transition,
côtier

2012 Questionnaire sur paramètres surveillés (CIS 2012)

2014 Nomination d'experts par pays et constitution d'un groupe de travail piloté par l'Allemagne sur 3 ans

2015 Réunion 1 : synthèse de questionnaires (paramètres, fréquences, périodes et seuils) Texeira et al. 2016, Phillips & Pitt 2015, Dworak et al. 2016

2016 Réunion 2 : Evaluation de l'outil pression-impact sur le jeu de données fourni lors de l'intercalibration biomasse

Rédaction d'un guide de bonnes pratiques pour la détermination des seuils et métriques nutriments

2017 Tool-kit évalué par les pays membres sur leur propre jeu de données

Exemple de relation obtenue avec le tool kit pour les MEC France

Comparaison européenne

2007 Workshop Zandword (NL)

2011 Workshop Birmingham (UK)

continuum terre – mer : lacs, rivières, transition,
côtier

2012 Questionnaire sur paramètres surveillés (CIS 2012)

2014 Nomination d'experts par pays et constitution d'un groupe de travail piloté par l'Allemagne sur 3 ans

2015 Réunion 1 : synthèse de questionnaires (paramètres, fréquences, périodes et seuils) Texeira et al. 2016, Phillips & Pitt 2015, Dworak et al. 2016

2016 Réunion 2 : Evaluation de l'outil pression-impact sur le jeu de données fourni lors de l'intercalibration biomasse

Rédaction d'un guide de bonnes pratiques pour la détermination des seuils et métriques nutriments

2017 Tool-kit évalué par les pays membres sur leur propre jeu de données
Réunion 3 : Validation du guide

Guide bonnes pratiques pour déterminer un seuil nutriment

-> Mise en évidence de suivis, de métrique et de seuils très différents d'un pays à l'autre

-> Ecosystèmes réagissant d'une façon différente à l'enrichissement en nutriments (lacs, rivières, transition, côtier)

-> Pas d'intercalibration réglementaire mais rédaction d'un guide proposant des outils communs pour aider à l'élaboration de métrique et de seuils nutriments

Document de compromis basé sur l'utilisation de la relation graphique pression impact et sur différentes méthodes alternatives

Conclusions

Avancées impulsés par la DCE : acquisition de données, début de lien sur le continuum terre-mer

Comparaison européenne : notre outil est basé sur la même théorie que le guideline avec des seuils comparables à ceux des pays voisins

Difficultés : bon état des rivières élaboré sur la masse d'eau et pas du tout sur l'impact des masses d'eau adjacentes situées en aval (élément évalué P et non N)

Perspectives : outil de prise en compte des facteurs de pressions multiples (projet européen MARS)

Demande d'harmonisation de l'AEE entre DCE et DCSMM

Grilles pour MEC de Méditerranée et DOM

Comparaison 2014 des seuils nutriments dans les eaux côtières

			très bon	bon	moyen	médiocre	mauvais
Percentile 10 oxygène dissous (mg/L)							
MEC et MET Mer du Nord MEC et MET Manche – Atlantique MEC Méditerranée	Juin-sept.	1/mois	> 5,0	3 – 5	2 – 3	1 – 2	< 1
MET Méditerranée	Juin-Août	1/mois	> 5,0	3 – 5	2 – 3	1 – 2	< 1

Conditions idéales pour détecter les anoxies :

- en été
- après bloom phytoplanctonique (dégradation de la matière organique respiration/nitrification)
- au fond de la colonne d'eau
- lors de stratification de la colonne d'eau
- dans les zones à faible renouvellement des eaux (lagunes, baies à faible courant résiduel)

2ème étape : élaboration de seuils et métriques : température

Température		très bon	moyen
EQR	6 ans	[1 – 0.95 [	[0.95 – 0]

2ème étape : élaboration de seuils et métriques : transparence

Répartition des masses d'eau côtières françaises en 5 groupes par une approche de classification hiérarchique ascendante (moyennes et écart-types trimestriels 1980-2007)

Détermination de 5 enveloppes sinusoidales (3 x intervalle interquartile)

2ème étape : élaboration de seuils et métriques : transparence

Climatologie de janvier de la turbidité moyenne de surface entre 2003 et 2009 (Gohin, 2011) :

-> gradient turbidité décroissant de la côte vers le large

-> concentrations moyennes plus élevées en hiver qu'en été

-> influence de la nature du sédiment, de la profondeur, de l'exposition au vent et à la houle, de l'intensité des courants

Ecotype n°1 :

- zones rocheuses,
- côtes méditerranéennes (sauf Languedoc),
- les côtes de l'île de la Réunion

Ecotype n°2 :

- lagunes

Ecotype n°3 :

- zones vaseuses/sableuses
- masses d'eau situées à l'embouchure des principaux fleuves

Problèmes :

-> homogénéité de la salinité dans une masse d'eau : une même masse d'eau peut contenir plusieurs zones halines

suivant la localisation du point déclaré représentatif de la masse d'eau, influence plus ou moins importante des apports d'eaux douces

-> durée et fréquence des dessalures ne peuvent être retenues en raison de la fréquence de prélèvement (mensuelle) : mise en œuvre d'outils haute fréquence sur des points particuliers -> lien avec hydromorphologie?

-> prise en compte de la typologie des masses d'eau

-> indicateur déclaré non pertinent vis à vis du suivi imposé par la circulaire 2007/20

Première étape : acquisition de données

Fréquence et période d'acquisition

Élément de qualité	Eaux de transition		Eaux côtières	
	Manche / Atlantique	Méditerranée	Manche / Atlantique	Méditerranée
<i>Phytoplancton</i>	<i>8 chloro*</i> <i>12 flores*</i>	<i>3 ou 12 chloro</i> <i>12 flores</i>	<i>8 chloro*</i> <i>12 flores*</i>	<i>12 chloro</i> <i>12 flores</i>
Température Salinité, Turbidité	Mesures effectuées pour toute mesure de phyto, O ₂ et nutriments			
Bilan d'oxygène	4 (juin-sept)	3 (juin-août)	4 (juin-sept)	4 (juin-sept)
Nutriments	4 (nov-fév)	3 (juin-août)	4 (nov-fév)	*2017

Fréquence annuelle minimale imposée par circulaire

2ème étape : élaboration de seuils et métriques : nutriments

ET manche atlantique, EC manche atlantique 1/26a

Evaluation 2012 sur

Rôle pondérateur des indicateurs physico-chimiques

Etat
chimique