

## Conseil Supérieur de la Pêche

Le nombre de saumons capturés en 1994 en zone fluviale (c'est à dire en amont de la limite de salure des eaux) est de 3894 par pêche aux lignes pour l'ensemble de la France et 130 par pêche professionnelle sur le bassin de l'Adour. Il faut ajouter à ces chiffres les captures estuariennes ou côtières, qui font l'objet d'estimations pour certains bassins (1035 captures dans le bassin de l'Adour), ainsi que des prélèvements qui peuvent s'exercer sur des stocks réglementairement protégés (voir cas du bassin de la Garonne, ci-après).

Rappelons que la pêche du saumon était interdite aussi bien pour les pêcheurs sportifs que pour les professionnels sur le bassin de la Loire, pour ne pas aggraver la situation difficile du stock de saumon dans l'attente de nouvelles mesures techniques de restauration.

La saison de pêche 1994 se caractérise par une forte augmentation des captures dans les cours d'eau du massif armoricain (Bretagne et Basse-Normandie). Avec plus de 3500 captures dans cette région, on double le score moyen des années 1987-1993, et on se trouve au niveau des captures des années 1970. Une différence importante à noter toutefois : une seule rivière, l'Aulne, représente à elle seule près du tiers des prises, avec plus de 1000 captures estimées.

Sur le bassin de l'Adour, la saison 1994 se situe dans la moyenne de la décennie.

# CAPTURES DE SAUMONS EN FRANCE

## SAISON DE PECHE 1994

COURS D'EAU	NOMBRE de CAPTURES	
	AUX LIGNES	PROFESSIONNELLES
BRESLE	20	
ARQUES	5	
TOUQUES	1	
SIENNE	65	
SEE	400	
SELUNE	150	
<b>TOTAL NORMANDIE</b>	<b>641</b>	
COUESNON	12	
LEFF	17	
TRIEUX	134	
LEGUER	120	
YAR	6	
DOURON	87	
PENZE	62	
JARLOT-QUEFFLEUTH	6	
ABER-ILDUT	2	
ELORN	240	
MIGNONNE	18	
CAMFROUT	21	
FAOU	7	
AULNE	1040	
<b>TOTAL BRETAGNE NORD</b>	<b>1772</b>	
GOYEN	36	
JET	105	
STEIR	143	
ODET	230	
AVEN	115	
ISOLE	15	
LAITA	11	
ELLE - INAM	173	
SCORFF	56	
BLAVET	305	
KERGROIX	10	
<b>TOTAL BRETAGNE SUD</b>	<b>1199</b>	
<b>LOIRE - ALLIER</b>	<b>PECHE</b>	<b>INTERDITE</b>
GAVE D'OLORON	250	
GAVE DE MAULEON	7	
NIVE	20	
NIVELLE	5	
ADOUR		130
<b>TOTAL SUD-OUEST</b>	<b>282</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3894</b>	<b>130</b>

### Les plus gros poissons par région :

#### Captures aux lignes :

- 92 cm pour 7,5 kg dans la Sélune (Normandie)
- 94 cm pour 7,8 kg dans le Blavet (Bretagne)
- 94 cm pour 7,5 kg dans le Gave d'Oloron (Sud-Ouest)
- 90 cm pour 7,9 kg dans le Gave d'Oloron

#### Captures professionnelles :

- 87,5 cm pour 5,75 kg dans l'Adour (Sud-Ouest)

Il manque cette année les gros poissons du bassin de la Loire qui étaient souvent champions toutes catégories !

### Informations diverses :

**Bassin de la Loire :** Les mesures d'interdiction de la pêche du saumon sont renouvelées pour 1995. Le programme "LOIRE GRANDEUR NATURE" se poursuit, avec notamment le projet de salmoniculture de Brioude, et l'aménagement de passes à poissons avec station de contrôle des migrations à Vichy.


**Soutien des stocks :** 1 250 000 juvéniles de saumons ont été introduits dans les cours d'eau en 1994. Des résultats significatifs sont obtenus :

- sur des bassins bretons (Couesnon, Trieux). Dans ce dernier, environ le quart des poissons capturés est issu du programme de repeuplement. C'est surtout sur l'Aulne que l'abondance des poissons constatée ces dernières années confirme les résultats des actions de soutien du stock,

- sur le bassin de la Garonne : 509 saumons ont été dénombrés cette année (stations de contrôle de Tuilières sur la Dordogne et Golfech sur la Garonne). Il est regrettable que ce constat très positif soit à tempérer par l'existence de captures illégales, aux lignes et aux filets, qui sont évaluées à un millier par la Délégation Régionale du Conseil Supérieur de la Pêche à Toulouse

**Un réseau de "correspondants saumon" :** Parmi les pêcheurs de saumon qui se sont manifestés ces dernières années auprès du Centre d'Interprétation des Captures de Salmonidés Migrateurs, un groupe représentatif de correspondants a été sollicité pour tenir des carnets de pêche destinés à apporter des informations utiles aux gestionnaires et complémentaires à celles fournies par les déclarations de captures.

CAPTURES DE SAUMONS EN ZONE FLUVIALE DE 1987 A 1994



## ⊗ CARACTERISTIQUES DES CAPTURES

3586 saumons ont été capturés en zone fluviale par pêche à la ligne dans les cours d'eau de Bretagne et Basse-Normandie en 1994. C'est donc une bonne année pour la pêche du saumon, conforme à nos prévisions de l'an dernier. Il faut toutefois observer qu'une très forte proportion de ces captures ont été faites dans le bassin de l'Aulne (plus de 1000 prises estimées).

Le graphique ci-contre montre que l'évolution constatée ces dernières années (augmentation de la part des grilses ou castillons dans les captures) se trouve confirmée. Avec les mesures de prolongation de la période de pêche en période estivale et automnale, les pêcheurs de saumons ont appris à apprécier cette catégorie de poissons auparavant peu estimés (mais sans doute injustement) pour la qualité de leur pêche. En outre, à la différence des saisons récentes, on a assisté en 1994 à une remontée du nombre de captures précoces (petits saumons de printemps). Faut-il mettre ce phénomène en relation avec des débits plus soutenus à l'ouverture ? Et dans ce cas, que deviennent les saumons de printemps les années sèches ?

## ⊗ ETAT DES STOCKS


Les populations de juvéniles de saumon sont contrôlées chaque année sur une quinzaine de stations faisant partie du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP). La production de l'année 1994 apparaît moyenne, c'est à dire moins élevée que celle des années 1991 et 1992, mais meilleure qu'en 1990, année peu productive faisant suite aux sécheresses de 1989 et 1990.

La Sélune (Manche) a bien récupéré des dommages consécutifs à la vidange des retenues EDF en 1993, et connaît une forte augmentation de sa population de tacons. Cette amélioration transparait également dans les captures (150 en 1994 contre seulement 4 en 1993 !)

## ⊗ DES RESULTATS ENCOURAGEANTS SUR CERTAINS BASSINS

Les actions de restauration et de soutien des stocks engagées ces dernières années se traduisent par des résultats positifs. Elles demandent à être poursuivies et confirmées par plusieurs années de bons résultats avant de pouvoir conclure à un succès durable.

## CAPTURES DE SAUMONS DANS LES COURS D'EAU DU MASSIF ARMORICAIN EN 1993



été contrôlés dans la station d'Antrain, sur l'affluent La Loysance. Il s'agit de premières remontées très significatives sur ce bassin, conséquence des actions expérimentales de repeuplement et de l'aménagement des obstacles à la circulation.

- Bassin du Trieux (Côtes d'Armor) : nouvelle progression des captures, avec un quart environ de poissons marqués provenant des opérations de repeuplement des années antérieures.

- Bassin de l'Aulne (Finistère) : saison exceptionnelle avec plus de 1000 captures, consacrant la réussite des actions de soutien des stocks à partir de la pisciculture du Favot. Les premiers aménagements de passes à poissons ont été réalisés en 1994. Il doivent se poursuivre dans les années à venir. La totalité des actions programmées sur le bassin doit être menée à bien pour obtenir le résultat recherché : réinstallation dans le bassin d'un stock naturel réalisant sans soutien son cycle biologique.


- Bassin du Scorff (Morbihan) : la station de contrôle du Moulin des Princes à Pont-Scorff a été mise en service. Propriété de la Fédération départementale des APPMA, elle associe l'INRA et le CSP dans un programme de recherche devant fournir de meilleurs outils de gestion des stocks de migrateurs. Elle doit également développer à l'avenir une mission d'accueil et d'information des pêcheurs et du public.

## ⊗ PREVISIONS POUR 1995


Avec les mêmes réserves que l'an dernier sur les conditions de croissance et de survie pendant la phase marine ainsi que sur les conditions hydrologiques pendant la saison de pêche, autant de facteurs que nous ne maîtrisons pas, nous pouvons risquer un pronostic assez favorable pour 1995 :

- les bonnes remontées de castillons de 1994, issues de bonnes saisons de reproduction en 1991 et 1992 devraient donner des bonnes montées de saumons de printemps en 1995,

- les résultats du suivi des zones de production de juvéniles dans le cadre du RHP laissent présager une remontée moyenne de castillons.



Conseil Supérieur de la Pêche



## Conseil Supérieur de la Pêche

### 1. CAPTURES

Comme prévu, la saison de pêche 94 se situe dans la moyenne de la décennie :

Le chiffre des captures par la pêche professionnelle est inférieur aux deux années précédentes : 130 captures en amont de la limite de salure des eaux et 1035 captures dans l'estuaire maritime (estimation IFREMER).

Quant aux captures à la ligne, elles sont estimées à près de 300 : mieux que l'an dernier... mais encore tellement en dessous de ce que devrait permettre un bassin comme l'Adour !

### 2. RESULTATS DU FRAI 93-94

Les contrôles automnaux par pêche électrique ont fait apparaître un recrutement naturel 1994 satisfaisant... sans plus. On ne s'attendait pas, il est vrai, à l'abondance record constatée l'année précédente dans la mesure où, d'une part, les géniteurs n'étaient pas très nombreux, d'autre part, les conditions hydroclimatiques hivernales, notamment sur le sous-bassin Nive, n'ont pas été idéales.

## SAUMONS DE L'ADOUR - BILAN DES CAPTURES 1994 - PERSPECTIVES POUR LES ANNEES PROCHAINES

### 3. PREMIERS ELEMENTS SUR LE FRAI 94-95

Il semble que la reproduction de cette année soit du même ordre de grandeur que celle de l'année dernière. De plus, l'hiver a été très pluvieux, ce qui n'est pas pour améliorer les choses. Trois notes optimistes, tout de même :

- au cours du printemps, une quinzaine de saumons adultes (plus autant de truites de mer) ont été capturés au piège de Chopolo, sur la basse Nive, pour être immédiatement transportés et relâchés sur la partie haute de la Nive des Aldudes, rivière que les géniteurs ne fréquentaient plus depuis longtemps.

L'opération de réimplantation semble avoir réussi puisque plusieurs frayères de saumon ont été observées cet hiver sur le tronçon d'accueil,

- le dernier barrage faisant obstacle total à la remontée des saumons sur le Gave de Pau, le barrage d'Artix, a été équipé d'une échelle cet été. Depuis lors, une vingtaine de saumons ont été comptés au dessus de cet obstacle et il est à peu près

certain qu'une reproduction a eu lieu en amont de Pau,

- deux saumons et une truite de mer ont été observés à Arudy, preuve que l'axe Ossau est, lui aussi, en bonne voie de recolonisation.

### 4. PREVISIONS DE RETOURS D'ADULTES EN 95

Alors que les recrutements naturels de 91 et 92 avaient été médiocres, celui de 93 s'est révélé excellent sur le bassin Adour. Un contingent particulièrement fourni de smolts d'un an a donc très certainement migré en mer au printemps 94... et un reliquat non négligeable d'individus nés en 93 migrera encore au printemps 95 (après deux années de vie en eau douce).

S'agissant des adultes, la saison qui s'amorce va coïncider avec la première vague de retour - un hiver de vie marine - de ce gros départ de smolts de 94 : on peut donc s'attendre à ce que l'année soit "bonne" - voire "très bonne" - pour les castillons tandis que 96 devrait logiquement être une "grande" année pour les 2 hivers de mer.

Tout ceci à la condition, bien sur, que la survie en mer ne s'écarte pas trop de la normale !